

## تأثيرات بعض المضادات الحيوية في داء المقوسات المستحدث في الفئران

صباح محمود الحيايلى و زهير ابراهيم فتوحى رحيمو

قسم علوم الحياة، كلية العلوم، جامعة الموصل، الموصل، العراق

### الخلاصة

تم في هذه الدراسة تقييم لكفاءة ست من المضادات الحيوية المختارة لدراسة تأثيرها منفردة ومقترنة في العلاج التجريبي لداء المقوسات المستحدث في الفئران وهذه المضادات الحيوية هي: كلنداميسين وكلاريثروميسين وسبيروفلوكساسين وسبايراميسين وروكسيثروميسين. اظهرت المضادات الحيوية قيد الدراسة تأثيراً تثبيطياً واضحاً على حيوية *Toxoplasma gondii* في الفئران إذ عملت هذه المضادات بصورة عامة على اطالة فترة البقاء الحي للفئران المعالجة بها والتقليل من نسبة الهلاكات موازنة بمجموعة السيطرة من الفئران غير المعالجة التي هلكت خلال فترة وجيزة نتيجة الإصابة الحادة بداء المقوسات. تم الحصول على نسبة شفاء عالية ١٠٠٪ في الفئران المصابة بداء المقوسات الحاد والتي عولجت بالمضاد الحيوي كلنداميسين وبجرعة ٣٠٠ ملغم/كغم/يوم ولمدة اسبوع واسبوعين. وحقت الجرعة اليومية ٥٠٠ ملغم/كغم من المضاد الحيوي سبيروفلوكساسين نسبة شفاء ٨٨,٨٨٪ وكانت نسبة الشفاء ٧٣٪ في الفئران المعالجة بجرعة يومية ٣٠٠ ملغم/كغم من المضاد الحيوي روكسيثروميسين ونسبة شفاء ٦٤٪ في الفئران المعالجة بجرعة يومية ٥٠٠ ملغم/كغم من المضاد الحيوي سبايراميسين. ولم يتحقق الشفاء من داء المقوسات المزمن المستحدث في الفئران المعالجة بالجرعة اليومية ٢٥٠ ملغم/كغم من المضاد الحيوي كلاريثروميسين ولكنه عمل على اطالة فترة البقاء الحي لهذه الفئران.

### Effects of some antibiotics on toxoplasmosis induced in mice

S. M. Al-Hayali and Z. I. F. Rahemo

Department of Biology, College of Science, University of Mosul, Mosul, Iraq

#### Abstract

This study concerned with the efficacy of six selected antibiotics to evaluate their effect as mono- and combined experimental therapy of toxoplasmosis induced in mice. These antibiotics are: clindamycin, clarithromycin, ciprofloxacin, spiramycin and roxythromycin as well as the compound methoprim (sulphamethaxazol SMZ-trimethoprim TMP). These antibiotics showed obvious inhibitory effect on the viability of *Toxoplasma gondii* in infected mice, as these antibiotics prolonged the survival rate of treated mice and the mortality rate was decreased compared with control non treated group of mice died during short period of time due to acute toxoplasmosis. High cure rate 100% was occurred in mice with acute induced toxoplasmosis when treated with 300 mg/ kg/day clindamycin for one and two weeks, while the dose of 500 mg/kg/day ciprofloxacin resulted in 88.88% cure rate, and a cure rate 64% resulted in mice treated with 500 mg/kg/day spiramycin. No cure was obtained, but prolonged survival rate only in chronically infected mice treated with 250 mg/kg/day clarithromycin.

Available online at <http://www.vetmedmosul.org/ijvs>

الكيميائية الكبريتية، وبهذا الصدد اختبر Araujo (٥) ثلاثة عقاقير مكونة من clindamycin و atovaquone و sulphadiazine وتيقن من تأثيرها التآزري في الفئران المصابة بالطفيلي واتضح من نتائجه المذكورة انفاً ان هذه العقاقير مجتمعة ذات تأثير واضح في علاج داء المقوسات الحاد في الفئران. وقيم Dumas (٦) كفاءة تناول المطول لعقار azithromycin على الفئران

#### المقدمة

ان داء المقوسات الذي جرت عليه الكثير من البحوث للكشف عنه في مصولات المشكوك في اصابتهم (١-٤) لم يحضى كثيراً بتجارب لعلاج. لقد جرى تقييم لكفاءة عدد من العقاقير، ومن ضمنها بعض المضادات الحيوية antibiotics والمركبات

بالمقارنة مع مجموعة السيطرة في الفئران. الفرق معنوي عند مستوى احتمال  $(P \leq 0.05)$  حسب (١٠).

### النتائج والمناقشة

**تقييم التأثير العلاجي للمضاد الحيوي كلينداميسين Clindamycin**  
**التجربة الأولى: استعمال المضاد الحيوي في العلاج لمدة اسبوع**

المجموعة الاولى (السيطرة) هلكت جميع فئران مجموعة السيطرة ٨/٨ اي ١٠٠٪ خلال الايام ٧-٢١ وبمعدل زمني للبقاء الحي ١١ يوماً بعد الحقن نتيجة لحين البطن ومظاهر الاصابة الاخرى بالطفيلي في حين هلك ٨/٥ فئران خلال الايام ١٥-٢٤ من المجموعة الثانية التي تلقت جرعة يومية ٥٠ ملغم/كغم كلينداميسين لمدة اسبوع وبمعدل زمني للبقاء الحي بلغ ١٩ يوماً. وفي نهاية التجربة ظلت ٣ فئران حية اذ تأكد بالتقييم الحيوي خلو ٢ منها من الاصابة وشخص استمرار الاصابة في الفار الاخر.

اما المجموعة الثالثة من الفئران التي تلقت جرعة يومية ١٥٠ ملغم/كغم كلينداميسين فهدت ٨/٢ فئران خلال الايام ٢٦-٤٢ وبمعدل زمني للحياة ٣٢,٥ يوماً وظل ٦ فئران على قيد الحياة حتى نهاية التجربة وتأكد بالتقييم الحيوي خلو ٥ فئران واستمرار الاصابة في فأر واحد فقط.

لم تحدث هلاكات بين مجموعة الفئران الرابعة التي تلقت جرعة يومية ٣٠٠ ملغم/كغم يومياً من الكلينداميسين لمدة اسبوع ايضاً وظلت حية حتى نهاية التجربة اذ ثبت بالفحص المجهرى والتقييم الحيوي لادمغتها خلوها من الاصابة.

ولم تظهر تأثيرات جانبية ظاهرية في مجموعة الفئران غير المصابة (السيطرة الدوائية) والتي تلقت اعلى جرعة من المضاد الحيوي المذكور ٣٠٠ ملغم/كغم يومياً لمدة اسبوع والتي ظلت حية طيلة فترة التجربة وظهر من التحليل الاحصائي باستخدام وجود فرق معنوي في معدلات الشفاء بين المجاميع العلاجية الثلاث، الجدول رقم ١.

**التجربة الثانية: استعمال المضاد الحيوي كلارثرومايسين في العلاج لمدة اسبوعين**

وفي تجربة اخرى استخدم فيها المضاد نفسه والجرع السابقة نفسها ولكن امتدت فيها فترة العلاج إلى اسبوعين بدلاً من اسبوع واحد، الجدول رقم ٢، اذ هلكت ٨/٢ فئران من المجموعة الثانية التي تلقت ٥٠ ملغم/كغم خلال الايام (٣١-٣٢) وبمعدل زمني ٢٧ يوماً وظلت ٦ فئران حية حتى نهاية التجربة اذ تأكد من استمرار الاصابة في ٣ منهم بعداجراء الاختبارات المجهرية والتقييم الحيوي للدماغ. لم تحدث هلاكات في المجموعتين الثالثة والرابعة التي تلقت ١٥٠ و ٣٠٠ ملغم/كغم/يوم على التوالي. وشخص بالتقييم الحيوي استمرار الاصابة في ٢ من فئران

المصابة بداء المقوسات المزمّن ووجد ان جميع الفئران التي عولجت بهذا العقار قد تم حمايتها تماماً من الاصابة. وقام Romand (٧) بتقييم لكفاءة عقار roxythromycin منفرداً او مقترناً مع عقار pyrimethamine او sulphadiazine على الفئران المصابة بالمقوسات الكوندية مختبرياً. ووجد انه عند استخدام عقار roxythromycin منفرداً وجرعة مقدارها ٥٠ ملغم/كغم يومياً ادت الى اطالة خفيفة في حياة هذه الحيوانات مقارنة بمثيلاتها من التي تتلقى العلاج ولكن لوحظ ان هناك تأثيراً شديداً عند الاستخدام المقترن العقاري roxythromycin و pyrimethamine او sulfadiazine وجرعة علاجية ١٢,٥ ملغم/كغم يومياً مما ادى الى اختزال ملحوظ في اعداد الطفيلي في كل من الدم والانسجة مقارنة بتلك الفئران التي عولجت فقط باستخدام أي من هذه العقاقير منفرداً، واستدل من هذه النتائج على ان التأثير العلاجي لكل من sulfadiazine و pyrimethamine على المقوسات الكوندية في الفئران ازدادت فعاليتها اذا ما اقترنت باستخدام roxythromycin (٧) وباستخدام عقار minocycline على الفئران المصابة بداء المقوسات المزمّن ووجد (٨) Changeux انخفاضاً مهماً في عدد الاكياس النسجية في الدماغ بعد ثلاثة اسابيع من العلاج وكانت الجرعة المستخدمة ٥٠ ملغم/كغم لكل يوم. وكما اتضح في اعلاه قلة الدراسات التي انصبت على التأثيرات الدوائية على داء المقوسات المستحدث وخاصة في قطننا العراقي لذا كانت الدراسة الحالية.

### المواد و طرائق العمل

#### المضادات

تم اختيار عينات من مجموعة من العقاقير بهدف تقييم كفاءتها في علاج داء القوسات والتي شملت كلينداميسين Clindamycin HCl، كلارثرومايسين Clarithromycin، سيبروفلوكساسيسين Ciprofloxacin HCl، سبيراميسين Spiramycin، وروكسيثرومايسين Roxithromycin.

#### تصميم التجارب العلاجية

صممت التجارب العلاجية واعتمدت المعايير على غرار ما ورد في (٩). عدلت الجرعة العلاجية للمضادات الحيوية المستعملة حسب اوزان الفئران الخاضعة للعلاج. احتسبت مسبقاً اعداد الطفيلي في المحقونة inoculum باستخدام شريحة عد كريات الدم حيث ان كل ١,٠ مل من اللقاح المأخوذ من عالق نسيج الدماغ لفأر مصاب بداء المقوسات تحتوي قرابة ٢٠ كيس نسجي. وكل ١,٠ مل من اللقاح المأخوذ من الراشح البريتوني لفأر مصاب بداء المقوسات تحتوي على قرابة ١٠٠ من الحيوانات السريعة.

تم استخدام اختبار Z لمقارنة الجرعة المختلفة من المضادات الحيوية ومجموعة السيطرة وذلك للحصول على أفضل جرعة، كما تم استخدام اختبار t تأثير العلاج على عدد الاكياس النسجية

المجموعة الثالثة المعالجة بـ ١٥٠ ملغم/كغم وبنسبة شفاء ٧٥٪. وظهر خلو فئران المجموعة الرابعة جميعها من الإصابة وبنسبة شفاء ١٠٠٪ نتيجة تلقيها الجرعة اليومية ٣٠٠ ملغم/كغم من الكليندامايسين لاسبوعين. ولم يظهر وجود فرق معنوي عند مقارنة معدلات الشفاء عند استعمال العلاج لاسبوع أو لاسبوعين والجرع الدوائية كافة وباستخدام اختبار  $Z < 0.05$ .

الجدول (١) تقييم تأثير المضاد الحيوي كليندامايسين Clindamycin على داء المقوسات الحاد المستحدث في الفئران لفترة اسبوع من العلاج.

نهاية التجربة ٣٨ يوماً بعد الإصابة		الفئران الحية		التقييم الحيوي		المجموعة العلاجية	
العدد		البقاء %		الشفاء %		الجرعة ملغم/كغم/يوم	
العدد		البقاء %		الشفاء %		الجرعة ملغم/كغم/يوم	
D 0	٠	٠	٠	١١	٨/٨	بلا علاج (سيطرة)	الاولى
C 25	٢	٣٧,٥	٣	١٩	٨/٥	٥٠	الثانية
B 62.5	٥	٧٥	٦	٣٢,٥	٨/٢	١٥٠	الثالثة
A 100	٨	١٠٠	٨	٣٨	٨/٠	٣٠٠	الرابعة

الحروف المختلفة عمودياً تعني وجود فروق معنوية بين المجاميع العلاجية عند مستوى احتمالية  $P < 0.05$ .

الجدول (٢) تقييم تأثير المضاد الحيوي كليندامايسين Clindamycin على داء المقوسات المستحدث في الفئران لمدة اسبوعين من العلاج.

نهاية التجربة ٤٥ يوماً بعد الإصابة		الفئران الحية		التقييم الحيوي		المجموعة العلاجية	
العدد		البقاء %		الشفاء %		الجرعة ملغم/كغم/يوم	
العدد		البقاء %		الشفاء %		الجرعة ملغم/كغم/يوم	
D 0	٠	٠	٠	11	٨/٨	بلا علاج (سيطرة)	الاولى
C 37.5	٣	٧٥	٦	٢٧	٨/٢	٥٠	الثانية
B 75	٦	١٠٠	٨	٤٥	٨/٠	١٥٠	الثالثة
A 100	٨	١٠٠	٨	٤٥	٨/٠	٣٠٠	الرابعة

الحروف المختلفة عمودياً تعني وجود فروق معنوية بين المجاميع العلاجية عند مستوى احتمالية  $P < 0.05$ .

تشبثي اكثر مما هو شفاي. لذلك شوهدت اطالات في زمن البقاء الحي للفئران بينما لم يحصل الشفاء التام من الإصابة نتيجة استخدام هذه الجرعة الدوائية الواطنة. وعند مقارنة النتائج الحالية مع دراسات اخرى نجد ان Nikolic وجماعته (١٢) توصل إلى تحقيق معدل بقاء ٦٢٪ يوم في مجموعة الفئران التي عولجت بجرعة ٥٠ ملغم/كغم/يومياً لاسبوع واحد كما وجد ان الزيادة في الفترة العلاجية ادت إلى زيادة معدلات البقاء وبالجرعة الدوائية نفسها وازداد ان تأثير الجرعة اليومية ٥٠ ملغم لمدة ثلاثة اسابيع اعطت نتائج مساوية للجرعة ٤٠٠ ملغم لمدة اسبوعين.

والجدير بالذكر ان المضاد الحيوي كليندامايسين قد اصبح احد البدائل الرئيسية للمقترن القياسي بايرميثامين Pyrimethamine. وسلفاديازين Sulfadiazin في علاج داء المقوسات. ولقد عرف حالياً ان ليس للكليندامايسين أي تأثير واضح في بناء البروتين في المايكوكوندريا بل انه واحد من

عندما امتد العلاج لفترة اسبوعين اعطت الجرعة ١٥٠ ملغم/كغم/يومياً والجرعة ٣٠٠ ملغم/كغم/يومياً معدلات بقاء ١٠٠٪ لمدة ٤٥ يوماً وهي نفس النتيجة التي حصل عليها في مجموعة الفئران التي تلقت جرعة دوائية ٣٠٠ ملغم/كغم/يومياً لمدة اسبوع. فضلاً عن ذلك ان فترة علاج لمدة اسبوعين وبالجرعة ٥٠ ملغم/كغم/يومياً حققت معدل بقاء ٧٥٪ وهو افضل من معدل البقاء ٣٧,٥٪ المتحقق من جراء نفس الجرعة لمدة اسبوع ومساو لمعدل البقاء جراء اعطاء الجرعة ١٥٠ ملغم/كغم/يومياً لمدة اسبوع واحد. ان هذه النتائج تأتي متشابهة مع المعطيات من التجارب في الزجاج حول تأثير هذا المضاد في نمو الطفيلي (١١).

الملاحظ من هذه التجارب ان الجرعة الواطنة ٥٠ ملغم/كغم/يومياً اظهرت تاثيرات مفيدة عند استعمالها لفترة اسبوعين وظهرت متكافئة مع الجرعة الاعلى ١٥٠ ملغم/كغم المستخدمة لفترة اسبوع وتؤكد ان تأثير الجرعة الواطنة هو

الفئران الهالكة ووجد ان عدد الاكياس النسجية فيها، تراوح من ١٩ إلى ١٠٢ وبمعدل ٦٤,٦ كيساً لكل دماغ. في اليوم ١٢١ بعد الإصابة جرى قتل الفئران الاربعة المتبقية على قيد الحياة من مجموعة السيطرة ووجد ان عدد الاكياس النسجية تراوح من ٥٧- ١٠١ كيس وبمعدل ٨٤ كيساً لكل دماغ، الجدول رقم ٣. اتضح من الصفة التشريحية Post-mortem التي عملت لعشر من الفئران الهالكة وجود مؤشرات عديدة على اصابتها بالتهابات رئوية Pneumonia فضلا عن حبن البطن، كما شوهد من فحص المقاطع النسجية للفئران الاربعة التي قتلت في اليوم ١٢١ وجود التهاب مزمن غير متخصص وارتشاح خلوي في الرئة والدماغ فضلا عن التهاب الشبكية المشيمي المزمن.

مجموعة المضادات الحيوية المعروفة بمضادات الوحدة الكبيرة large subunit antibiotic (LSU) التي تستهدف الشريط القمي Apicoblast (١٣). يظهر من مجمل النتائج ان لهذا المضاد الحيوي تأثيراً واضحاً وفعالاً في اعادة الطفيلي في الفئران المصابة مختبرياً عند اعطائه بجرعة عالية ٣٠٠ ملغم لمدة اسبوع أو اعطائه بجرعات متوسطة (١٥٠ ملغم) ولمدة زمنية اطول.

### تقييم التأثير العلاجي للمضاد الحيوي كلاريثرومايسين Clarithromycin (السيطرة)

هلك ١١ فاراً من مجموعة ١٥ فأر ٧٣,٣٣٪ مصاباً من مجموعة السيطرة والتي لم تتلقى العلاج بالمضاد الحيوي المذكور وذلك خلال ١٢٠ يوماً بعد الإصابة. فحصت ادمغة

الجدول (٣) تأثير المضاد الحيوي كلاريثرومايسين Clarithromycin على داء المقوسات المزمن المستحدث في الفئران والعلاقة بين عدد الاكياس النسجية الدماغية في الفئران المصابة والمعالجة مقارنة باعداد هذه الاكياس في الفئران غير المعالجة.

مجموعة الفئران المصابة	عدد الايام بعد الإصابة	عدد الفئران الهالكة	عدد الفئران البقاء %	اعداد الاكياس النسجية للدماغ في الفأر الواحد	الاكياس النسجية الدماغية العدد الكلي / (كيس/دماغ)
	٦٣	٣	٨٠	٢١, ٣٧, ٣٥	
	٨١	٢	٦٧	١٩, ٣٦	
	٨٢	١	٦٠	٥١	
	٩٠	١	٥٣	٧٢	
المجموعة الاولى مجموعة السيطرة ١٥ فأر مصاب (بلا علاج)	٩٣	١	٤٧	٧١	٦٤, ٦/٩٦٩
	٩٤	١	٤٠	١٠٢	
	٩٥	١	٣٣	١٠٠	
	١٠٠	١	٢٧	٩٩	
	١٢١	*٤	٠	57, 101, 87, 91	84/336
	١٢١	٤	١٠٠	19, 26, 21, 23	٨٩22.25/
المجموعة الثانية مجموعة العلاج ١٥ فأر مصاب ٢٥٠ ملغم/كغم / يوم كلاريثرومايسين	١٣٠	٤		30, 23, 25, 23	٢٥, ٢٥/١٠١
	١٤٧	٤		30, 23, 41, 13	٢٤, ٤٦/٣٦٧
	١٥٠	٣		19, 26, 29	٢٤, ٦٦/٧٤

\* الفئران التي ظلت على قيد الحياة من مجموعة السيطرة، وجود فرق معنوي بين عدد الاكياس النسجية في المجموعة المعالجة وغير المعالجة باستخدام اختبار (t=5.02, P<0.0001).

### المجموعة الثانية (العلاج)

و ١٣١ بعد الإصابة بعد وقف العلاج قد تقرب من ١٢ إلى ٣٠ كيساً وبمعدل ٢٣,٧٥ كيساً للدماغ مقارنة بمعدل ٨٤ كيساً / دماغ للفئران الاربعة التي جرى قتلها في اليوم نفسه من مجموعة السيطرة غير المعالجة وظهر بالتحليل الاحصائي وجود فرق معنوي (P<0.0001) عند مقارنة معدل الاكياس النسجية في المجموعتين كليهما. عاش ٧ فئران حتى اليوم ١٥١ بعد الإصابة و ٢٠ يوماً من التوقف من اعطاء العلاج والتي قتلت بعد ذلك واستأصلت ادمغتها لتخضع للفحوصات المجهرية والتقييم الحيوي في فئران سليمة اخرى وتبين استمرار الإصابة في الفئران المعالجة جميعها.

عاشت الفئران الخمس عشرة جميعها والخاضعة للعلاج بالمضاد الحيوي ٢٥٠ ملغم/كغم كلاريثرومايسين واستمرت بدون اعراض أو مظاهر مرضية اخرى خلال فترة المراقبة التي استغرقت ١٢٠ يوماً بعد الإصابة، الجدول رقم ٣. وظهر بالتحليل الاحصائي وجود فرق معنوي بين مجموعتي السيطرة والعلاج في حدوث الهلاكات (P<0.05) في اليوم ١٢٠ من التجربة اذا كان معدل البقاء في مجموعة السيطرة ٢٧٪ مقارنة بـ ١٠٠٪ في مجموعة العلاج. كان عدد الاكياس النسجية في ادمغة ٨ من الفئران الخاضعة للعلاج والتي قتلت في الايام ١٢١

### المجموعة الثالثة

ان فئران المجموعة الثالثة التي تلقت عن طريق الفم الجرعة الدوائية ٥٠٠ ملغم/كغم/يوم لم تحصل هلاكات طيلة فترة ١٤ يوماً من العلاج والتي اعقبتها فترة ٣٠ يوماً من المراقبة وكانت نسبة البقاء ١٠٠٪ للمجموعتين كليهما في نهاية التجربة وبعد ٤٥ يوماً من الإصابة بالطفيلي، قُتلَت الفئران المتبقية حية وخضعت انسجتها للفحوصات المجهرية وبالتقييم الحيوي لادمغتها في فئران سليمة اخرى لغرض التأكد من استمرار الإصابة في عدمها تأكد بالفحوصات المجهرية من استمرار الإصابة بالطفيلي في ٤ فئران من المجموعة الثانية (المعالجة ٢٥٠ ملغم سيبروفلوكساسين) وتيقن بالتقييم الحيوي من خلو ٥ فئران من هذه المجموعة من الطفيلي وكانت نسبة الشفاء لهذه المجموعة (٥٥,٥٥٪). وظهر من التحليل الاحصائي لمعدلات البقاء وجود فرق معنوي بالمقارنة مع مجموعة السيطرة ( $P < 0.0001$ ) باستخدام اختبار Z.

اظهر بالفحص المجهرية استمرار الإصابة في فأر واحد من المجموعة الثالثة (المعالجة ٥٠٠ ملغم سيبروفلوكساسين) وتأكد بالتقييم الحيوي اختفاء الإصابة بالطفيلي في ثمانية منها وتحقق نسبة شفاء ٨٨,٨٨٪ لافراد هذه المجموعة. ظهر بالتحليل الاحصائي وجود فرق معنوي في معدلات البقاء بين مجموعة السيطرة ومجموعة العلاج الثالثة ( $P < 0.05$ ) باختبار Z. ولم يظهر فرق معنوي في معدلات البقاء بين مجموعتي الفئران المعالجة بـ ٢٥٠ ملغم و ٥٠٠ ملغم من المضاد المذكور، الجدول رقم ٤. لم تشاهد خلال هذه التجربة اية اعراض جانبية في مجموعة الفئران غير المصابة والتي تلقت جرعة يومية ٥٠٠ ملغم/كغم لفترة ١٤ يوماً مثل الهزال أو انتصاب الشعر Piloerction أو فقدان الوزن أو حصول هلاكات طيلة فترة التجربة مما يدل على عدم سمية المضاد المذكور وسلامة اعطائه في العلاج التجريبي في الفئران. اختير هذا المضاد الحيوي من مجموعة الكلونولونس quinolones لبعض خصائصه المفيدة فهو مضاد صناعي للجراثيم Synthetic antibacterial واسع الطيف ويمتلك تركيباً متغيراً مما يرفع من كفاءته ضد الاحياء المجهرية فضلاً عن صفته القاتلة للجراثيم bactericidal واليته في المداخلعة مع الانزيم DNA gyrase الضروري لانتاج DNA في الكائنات المجهرية. وحسب المعلومات المتوافرة من الابحاث المنشور فان هذه التجربة هي المحاولة الاولى التي تقيم فيها تأثيرات هذا المضاد الحيوي في التجارب العلاجية على الفئران المصابة بداء المقوسات مختبرياً. ولعدم العثور على مصدر يوثق استخدام هذا المضاد في مثل هذه التجارب لذا هذه التجربة عدت رائدة في هذا المجال، وان ظهر العكس فلا بد ان هذه النتائج ستوفر معطيات جديدة مضافة قد يمكن الاستفادة منها مستقبلاً في مجال العلاج التجريبي لداء المقوسات ولاسيما من سلالة هذه الطفيلي التي عزلت من اصول بشرية محلية.

بقيت الفئران غير المعالجة لمدة شهرين بلا اعراض قبل نشوء الاصابات المميته والتي تميزت بالمضاعفات العصبية في المراحل الاخيرة اذ شخصت الاعتلالات العصبية في ادمغتها فيما بعد. اختير المضاد الحيوي كلاريثروميسين وهو من مجموعة الماكروليدات التي جلبت الانتباه في علاج عدد من الامراض الطفيلية (١٣) وبخصائصها في اطالة تثبيط الانقسام داخل الخلية لاطوار الطفيلي (١٤) وفعاليتها، ضد الاطوار المتكيسة في الزجاج (١٥) وفعاليتها في علاج داء المقوسات التجريبي في الفئران (١٦). ولقد روعي في هذه التجربة ان تتلقى الفئران الجرعة ٢٥٠ ملغم /كغم/يوم بوصفها مناظرة للجرعة التي تناسب الانسان بعد تعديل حجمها. ان التعاطي المطول لهذا المضاد الحيوي في الفئران بالرغم من اختزاله لعدد الوفيات ولكنه فشل في الحصول على الشفاء التام من داء المقوسات المزمع في هذه الانماط من الفئران. ان الفرق الكبير في المعدل العددي للاكياس النسجية في دماغ الفئران التي قُتلَت في اليوم ١٢١ من المجموعتين كليهما (السيطرة والعلاج) اظهر وجود فرق معنوي ( $P < 0.0001$ ) وان استخدام المضاد المذكور نتج عنه اختزال في عدد الاكياس النسجية في ادمغة الفئران المعالجة به. ومن ناحية اخرى، فقد صاحب تعاطي هذا المضاد اختزال واضح في الالتهابات الدماغية في الفئران وبحسب المشاهدات النسجية.

يتضح من الدراسة الحالية واعتماداً على سابقاتها من الدراسات التي اظهرت النشاط الفعال المضاد لداء المقوسات لمجموعة من الماكروليدات (١٤) ان لهذا المضاد تأثير فعال مقارنة باقرانه من المضادات المايكروليديه عند التجارب في الفئران لاسيما في حماية هذه الحيوانات من الموت جراء الإصابة الحادة بداء المقوسات.

### تقييم التأثير العلاجي للمضاد الحيوي سيبروفلوكساسين Ciprofloxacin، المجموعة الاولى (السيطرة)

هلكت ٧ فئران من المجموعة السيطرة التي لم تتلق العلاج بالمضاد المذكور، ابتداءً من اليوم السادس وحتى اليوم الثاني عشر بعد الإصابة بالطفيلي وكنتيجة لحبن البطن واطهرت التشخيصات المجهرية للراشح البريتون (Pex) المسحوب من هذه الفئران المشرفة على الهلاك احتواء هذه الرواشح على المقوسات الكوندية وبقيت ٢ من الفئران في مجموعة السيطرة حية حتى نهاية التجربة في اليوم الخامس والاربعين بعد الإصابة والتي جرى قتلها فيما بعد وفحصت ادمغتها وتأكد مجهرياً من اصابتها بالطفيلي بمشاهدة الاكياس النسجية في عالق النسيج المتجانس للدماغ.

### المجموعة الثانية

ظلت فئران المجموعة الثانية جميعها حية والتي تلقت عن طريق الفم الجرعة الدوائية ٢٥٠ ملغم/كغم/يوم.

اذ ما امتد العلاج لفترة اطول من اسبوعين وهذا ما قد تكشف عنه دراسة لاحقة قبل التطرق إلى تطبيق فكرة علاج داء المقوسات الحاد بهذا المضاد في الانسان. ان الية عمل معظم المضادات الحيوية عرفت في الجراثيم ومن المحتمل امتلاك هذه المضادات الية عمل عامة مشابهة في الاوالي (١٣). وبهذا الخصوص اشار Araujo وجماعته (١٧) ان طرائق عمل الادوية المضادة للمقوسات الكوندية غير معروفة غالباً. وعلى أية حال فإنه من المحتمل ان هذا المضاد قد يعمل على تثبيط البناء البروتين لغشاء المقوسات الكوندية مما يؤدي إلى ارباك عملها ومن ثم موتها. أو ربما كان التأثير في DNA الموجود في النواة ما يثبط أو يقطع طريقة تضاعفه.

وتساوى تأثير المضاد الحيوي في معدلات البقاء الحي في مجموعتي الفئران الثانية والثالثة اذ ظل جميع افراد هاتين المجموعتين احياء حتى نهاية التجربة ولكن اختلفت نتائج التقييم الحيوي باختلاف الجرعة المعطاة لكل من المجموعتين، اذ كانت نتيجة اعطاء الجرعة ٥٠٠ ملغم/كغم هو التخلص من الاصابة في ٨ من فئران هذه المجموعة وحققت هذه الجرعة نسبة شفاء 8.888 % وهي اعلى من نسبة الشفاء المتحققة من جراء اعطاء الفئران المصابة ٢٥٠ ملغم/كغم من نفس المضاد.

ان هذه النتائج المقترنة باستعمال هذا المضاد في علاج داء المقوسات الحاد في الفئران قد تعد من النتائج الواعدة نظراً لنسبة الشفاء العالية والتي قد يمكن الارتفاع بها إلى نسبة شفاء ١٠٠٪.

الجدول (٤) تقييم تأثير المضاد الحيوي سيبروفلوكساسين Ciprofloxacin على داء المقوسات الحاد المستحدث في الفئران لفترة اسبوعين من العلاج.

نهاية التجربة ٤٥ يوماً بعد الاصابة		الفئران الحية		التقييم الحيوي		الشفاء %	
المعدل اليومي للحياة		عدد البقاء %		عدد		الشفاء %	
عدد الفئران الهالكة/العدد الكلي		عدد البقاء %		عدد		الشفاء %	
٩/٧	٧,٨٥	٢	٢٢	٠	٠	٠	C 0
٩/٠	٤٥	٩	١٠٠	٥	٥	٥٥.٥٥	B 55.55
٩/٠	٤٥	٩	١٠٠	٨	٨	٨٨.٨٨	A 88.88

الحروف المختلفة عمودياً تعني وجود فروق معنوية بين المجاميع العلاجية عند مستوى احتمالية ٠,٠٥.

البالغة ١٤ يوماً. وهلك ٥ فئران اخرى بعد التوقف من اعطاء المضاد الحيوي أي خلال فترة المراقبة التي استمرت ٣٠ يوماً لتبلغ نسبة الهلاكات في هذه المجموعة 63.63% وبمعدل زمني للبقاء الحي ٣٥,٢ يوم. وظلت اربع فئران منها حية حتى نهاية التجربة في اليوم الخامس والاربعين وكانت نسبة بقاء لهذه المجموعة 36,36%. واطهر الفحص المجهرى والتقييم الحيوي لهذه الفئران الاربعة، نظافة ٣ منها من الطفيلي واستمرار الاصابة في واحد منها فقط وتحقق بذلك نسبة شفاء 27,27%. بين افراد هذه المجموعة من جراء تلقى جرعة يومية ٢٥٠ ملغم/كغم من المضاد الحيوي سيبراماميسين لمدة ١٤ يوماً. واطهر التحليل الاحصائي وجود فرق معنوي ( $P < 0.05$ ) مقارنة مع مجموعة السيطرة وباستخدام اختبار Z.

#### المجموعة الثالثة (العلاج ٥٠٠ ملغم/كغم)

لم تحدث اية هلاكات بين افراد المجموعة الثالثة المعالجة بـ ٥٠٠ ملغم/كغم/يوم خلال فترة العلاج البالغة ١٤ يوماً، ولكن هلكت ٣ فئران خلال فترة المراقبة الممتدة ٣٠ يوماً التي اعقبت التوقف عن اعطاء العلاج، بلغت نسبة الهلاك في هذه المجموعة 27%. وبمعدل زمني للبقاء الحي ٤٢ يوماً. ظلت ثمانية فئران احياء حتى نهاية التجربة في اليوم الخامس والاربعين والتي قتلت فيما بعد وظهر نتيجة الفحوصات المجهرية والتقييم الحيوي

#### تقييم التأثير العلاجي للمضاد الحيوي سيبراماميسين Spiramycin المجموعة الاولى (السيطرة)

هلكت ٩ فئران 81,81% من مجموعة السيطرة ابتداء من اليوم السابع وحتى اليوم الحادي عشر بعد الاصابة وفي اليوم السادس عشر بلغت نسبة الهلاكات 100%. بهلاك ٢ من الفئران المتبقية من هذه المجموعة نتيجة للاصابة الحادة والتي تسببت في حبن البطن، ووفرة في الرواشح البريتونية، وشوهت المقوسات في كل منها بالفحص المجهرى للراشح البريتوني. لوحظ في اليوم الرابع بعد تحقيق الاصابة ظهور علامات مرضية طفيفة في غالبية الفئران مثل الخمول وقلة الحركة واخذت العلامات المرضية بالزوال تدريجياً وعاد النشاط الطبيعي لمجاميع الفئران ابتداءً من اليوم الثالث من المباشرة بالعلاج في حين استمر تدهور الحالة المرضية في الفئران غير المعالجة (السيطرة) وظهور حالات النزاع بينها وكان معظمها على وشك الموت عندما شرع في قتلها.

#### المجموعة الثانية (العلاج ٢٥٠ ملغم/كغم)

بوشر بالعلاج بالمضاد الحيوي بعد ٢٤ ساعة من تحقيق الاصابة وكانت نسبة الهلاكات 18%. بين فئران المجموعة الثانية المعالجة ٢٥٠ ملغم/كغم/يوم اذ هلكت ٢ من افرادها في اليوم الحادي عشر واليوم الرابع عشر من الاصابة خلال فترة العلاج

نسبة متدنية من لشفاء لانه من المعروف ان الطفيلي المقوس كوندري باطواره السريعة باستطاعتها التكاثر بالانقسامات السريعة في دورة كل ٤-٦ ساعات مما يؤدي إلى ارتفاع في الطفيلمة الدموي وهجرة الاطوار إلى الانسجة المختلفة والتكيس فيها مما يوفر لها الحماية والوقاية من التأثير الدوائي للمضاد الحيوي وهذا ما أكده Theirman وجماعته (١٨). ان السبيراميسين يعمل على الحد من التكاثر المبكر للطفيلي وانتشاره ولكن لا يمنع نشوء الاكياس النسجية وديمومة الاصابات الساكنة (١٩).

عرف السبيراميسين واحداً من الماكروليدات التي تمتلك طيفاً ضد الجراثيم يقارن بطيف الاريتروميسين erythromycin ويمتلك نشاطاً ضد المقوسات الكوندية كما شوهد من التجارب في الفئران وفي الزجاج ولو ان التركيز الحقيقي الضروري لتثبيط نمو أو قتل الكائنات غير معروف. ولقد وصف هذا المضاد بان له ديمومة عالية في الانسجة اذا ما قورن بالاريتروميسين. وان المستويات العالية لهذا المضاد في الانسجة كانت سبباً لاعتباره من المضادات الاكثر فاعلية ونشاطاً ضد الجراثيم المتحسسة في الكائن الحي *in vivo* ويعد السبيراميسين من الادوية المختارة والشائعة التداول في علاج داء المقوسات خلال فترة الحين. كما عرف ان السبيراميسين يختزل بنسبة ٦٠٪ من انتقال الطفيلي المقوس إلى الجنين (٢٠) ويبلغ تركيزه في المشيمة ٣ إلى ٥ مرات اعلى من تركيزه في الدم أو الانسجة الاخرى في الام (٢١).

نظافة ٧ منها من الطفيلي واستمرار الإصابة في فأر واحد وبلغت نسبة البقاء الحي لافراد هذه المجموعة ٧٣٪ ونسبة الشفاء ٦٤٪ من جراء اعطائها الجرعة ٥٠٠ ملغم/كغم يومياً لاسبوعين من المضاد الحيوي سبيراميسين. اظهر التحليل الاحصائي باستخدام اختبار Z وجود فرق معنوي بين نسب الشفاء للمجاميع العلاجية كافة ( $P < 0.05$ ).

ظهر من جراء استعمال المضاد الحيوي ان الجرعتين كلتيهما ٢٥٠ ملغم و ٥٠٠ ملغم وفرت الحماية للفئران من الموت من داء المقوسات الحاد ولو ان المضاد استخدم بعد ٢٤ ساعة من تحقيق الإصابة وكما لوحظ كذلك وجود فرق معنوي في معدلات البقاء الحي بوساطة المراقبة اليومية بعد العلاج فضلاً عن اختلاف نسب الشفاء في المجموعتين كلتيهما بعد قطع العلاج.

كان لاستعمال المضاد الحيوي في هذه التجربة تأثير واضح في اطالة فترة بقاء الفئران على قيد الحياة ولو بنسب متفاوتة تبعاً للجرعة الدوائية المعطاة لكل مجموعة ولكن مع ذلك لم يتم الحصول على نسبة شفاء ١٠٠٪ في أي من المجاميع بالرغم من اعطاء واحدة من المجاميع جرعة كبيرة يومية ٥٠٠ ملغم/كغم لمدة اسبوعين، مع ذلك فان نسبة الشفاء ٦٤٪ المتحققة جراء اعطاء ٥٠٠ ملغم/كغم من هذا المضاد تعتبر جيدة مقارنة مع نسبة الشفاء المنخفضة ١٦,٧٪ التي حصل عليها (١٨) في مجموعة فئران التي باشر بعلاجها بعد ٧٢ ساعة من اصابتها بالطفيلي وربما كان التأخير في اعطاء العلاج سبباً في حصول

الجدول (٥) تقييم تأثير المضاد الحيوي سبيراميسين Spiramycin على داء المقوسات الحاد المستحدث في الفئران لفترة اسبوعين من العلاج.

المجموعة العلاجية	الجرعة ملغم/كغم/يوم	فترة العلاج + المراقبة (٤٥ يوم)			
		عدد الفئران الهالكة/العدد الكلي	المعدل اليومي للحياة	عدد البقاء %	التقييم الحيوي
الاولى	بلا علاج (سيطرة)	١١/١١	١٠	٠	٠
الثانية	٢٥٠	١١/٧	٢٩	٣٦,٣٦	٣
الثالثة	٥٠٠	١١/٣	٤٢	٧٢,٧٢	٧

الحروف المختلفة عمودياً تعني وجود فروق معنوية بين المجاميع العلاجية عند مستوى احتمالية ٠,٠٥.

الانسجة المختلفة للاعضاء المستأصلة من الفئران الهالكة او المشرفة على الهلاك ثم التشخيص النهائي بمشاهدة الاكياس النسجية في الدماغ.

#### المجموعة الثانية (العلاج ١٥٠ ملغم/كغم)

تلقت هذه المجموعة من الفئران العلاج عن طريق الفم جرعة ١٥٠ ملغم/كغم/يوم من روكسيثروميسين لمدة ١٤ يوماً بعد ٢٤ ساعة من تلقيها الإصابة بالطفيلي في التجويف البريتوني خلال فترة العلاج والمراقبة هلكت ٥ فئران من هذه

#### تقييم التأثير العلاجي للمضاد الحيوي روكسيثروميسين Roxthromycin المجموعة الاولى (السيطرة)

هلكت فئران هذه المجموعة جميعها والبالغ عددها ١١ فأراً التي حقنت بالطفيلي وتركت بلا علاج وذلك خلال الفترة ابتداء من اليوم السادس وحتى اليوم السابع عشر بعد الحقن بالطفيلي وبمعدل زمني للبقاء الحي ٩,٨ ايام. حدثت الهلاكات بسبب الإصابة الحادة بداء المقوسات والذي تمثل بحدوث ظاهرة النزغ والإشراف على الموت مصحوباً بحين البطن. شخصت الإصابة بالفحص المجهرى لمسحات من السائل البريتوني وبصمات من

روكسيثرومايسين لمدة اسبوعين في الفئران بعد ٢٤ ساعة من اصابتها بالطيفلي.

ظهر من التحليل الاحصائي باستخدام اختبار - Z وجود فرق معنوي في معدل البقاء بالمقارنة مع مجموعة السيطرة ( $P \geq 0.05$ ) ومجموعة العلاج الاولى ( $P \geq 0.05$ ) في نسب الشفاء بالمقارنة مع المجموعة العلاجية (١٥٠ ملغم) ( $P \geq 0.05$ ). وهناك العديد من الادلة المستنبطة من دراسات اخرى تفيد ان الماكروليدات الحديثة عرف لها نشاط فعال ضد المقوسات الكوندية في الزجاج (٢٢) وفي الكائن الحي (٢٣) بالرغم من عدم وضوح طرائق عملها. وظهرت دراسة اولية اهمية المضاد روكسيثرومايسين في الوقاية من المقوسات بين المرضى المصابين بمتلازمة العوز المناعي المكتسب الايدز (٢٤). و اشار العديد من الباحثين إلى فاعلية هذا المضاد ضد المقوسات الكوندية في الاصابات التجريبية في الفئران وكانت النتائج المستوحاة من هذه الدراسات متوافقة مع نتائج دراستنا الحالية وعلى أية حال فان الجرعة المستعملة كانت عالية وكما في الماكروليدات الاخرى فان من النادر الحصول على اعادة كاملة للاصابة بداء المقوسات الناشئة في الفئران (١٩).

ومن الجدير بالذكر ان اعلى جرعة استخدمت في التجربة الحالية كانت ٣٠٠ ملغم/كغم روكسيثرومايسين وتوصل فيها إلى نسبة شفاء ٧٣٪ وربما كان من الممكن التوصل إلى اعادة كاملة للطيفلي في حال استعملت جرعة اكبر وعلى سبيل المثال ٥٠٠ ملغم /كغم. نظراً للفاعلية الدوائية الجيدة التي اخص بها المضاد روكسيثرومايسين لذا شاع استعماله في علاج داء المقوسات في مرضى الايدز (٢٥) وعند الاخذ بعين الاعتبار جانب الحركة الدوائية pharmacokinetic فان روكسيثرومايسين بتركيزه العالي في البلازما وتعاطيه الفموي واختراقه الجيد للانسجة وخيار الجرعة الواحدة اليومية منحته الافضلية على بعض من الماكروليدات الاخرى بالإضافة إلى قابليته للاختراق السريع لخلايا اللبائن والتي قد تكون عاملاً مهماً في علاج الممرضات داخل الخلية كما في الطيفلي المقوس. ولا بد من الإشارة إلى عدم ظهور اعراض جانبية أو حدوث هلاكات بين فئران مجموعة السيطرة التي تلقت ٣٠٠ ملغم /كغم لمدة اسبوعين والذي يظهر عدم سمية هذا المضاد.

ولغرض اكمال الصورة لعمل المضادات الحيوية يمكن استعمال النظائر المشعة Radioactive isotopes المنوه عنها في (Mader, 1998) اذ يمكن ان تخلق مع المضادات وتتبع عملها وتداخلها مع الفعاليات الحيوية للطيفلي لتتبع عمل كل مضاد حيوي فالاشعاعات المنبعثة من مواقع النظائر Position emission tomography يمكن معالجتها بالحاسوب لتكوين صور قطاعية عرضية Cross-sectional images التي يمكن ان تشير إلى مختلف الفعاليات الحيوية في مختلف الانسجة أو ضمن عضيات الخلية الواحدة.

من الصعب وضع هذه النتائج في منظور مقارنة مع كفاءة هذه العقاقير أو غيرها منفردة أو مقترنة في نماذج اخرى من

المجموعة خلال الايام من ١٢ إلى ٢١ يوم وبمعدل زمني للبقاء الحي ١٩ يوم. ثم هلكت ٣ فئران اخرى خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٣ يوم وبمعدل زمني للبقاء الحي ٢٣ يوم وذلك خلال فترة المراقبة البالغة ٣٠ يوماً. وظلت ٣ فئران حية حتى نهاية التجربة بعد ستة اسابيع من الاصابة وتحقق لهذه المجموعة نسبة بقاء الحي ٢٧٪. انهيته التجربة في اليوم الخامس والاربعين بعد الاصابة وجرى قتل الفئران الثلاث المتبقية على قيد الحياة. ثم خضعت ادمغتها للفحوصات المجهرية والتقييم الحيوي في فئران سليمة اخرى وتاكد من خلوها جميعاً من الطيفلي ولتصبح نسبة الشفاء في هذه المجموعة من الفئران ٢٧٪.

اتضح تأثير الجرعة ١٥٠ ملغم/كغم روكسيثرومايسين في الفئران المصابة من المجموعة الثانية في هذه التجربة والتي ادت إلى التخفيف من حدة الاصابة التي عادة تعقب الحقن بالحيوانات السريعة في الفئران وبذلك عملت على التقليل من الهلاكات في الحيوانات المحقونة بالطيفلي كما لوحظ ان لهذه الجرعة من المضاد روكسيثرومايسين تأثيرها الايجابي الذي تميز بأطالته لامتد البقاء الحي في الفئران المصابة مقارنة بمجموعة السيطرة غير المعالجة وظهر من التحليل الاحصائي باستعمال اختبار - Z وجود فرق معنوي بالمقارنة مع مجموعة السيطرة في كل من المعدل اليومي للبقاء ( $P < 0.05$ ) و نسبة البقاء الحي ( $P < 0.05$ ) خلال فترة ٤٥ يوماً من التجربة. وظهرت النتائج ان روكسيثرومايسين كان تأثيره على قتل الطيفلي نهائياً في ٣ فئران ٢٧٪ فقط من هذه المجموعة وجرعة يومية ١٥٠ ملغم/كغم ولم يعثر على الطيفلي لا بالفحص المجهرى ولا بالتقييم الحيوي لعينات من انسجة هذه الفئران.

### المجموعة الثالثة (العلاج ٣٠٠ ملغم/كغم)

لوحظ في فئران هذه المجموعة انخفاض شديد في نسبة الهلاكات ٩٪ بهلاك فأر واحد فقط في اليوم الرابع عشر من العلاج بالمضاد الحيوي واليوم الخامس عشر بعد الحقن بالطيفلي ولم يشاهد الطيفلي المقوس عند الفحص المجهرى لمسحات السائل البريتوني وبصمات الانسجة للدماغ والرنة لهذا الفأر وربما كان الموت لاسباب غير داء المقوسات. كان معدل البقاء في هذه المجموعة ٩١٪ اذ ظلت ٨ فئران حية حتى نهاية التجربة في اليوم الخامس والاربعين بعد الاصابة ثم انهيته التجربة وقتلت الفئران الحية وتاكد بالاختبارات النسجية لمسحات من الدماغ وبالتقييم الحيوي لادمغتها في فئران سليمة اخرى من ٨ فئران من الطيفلي المقوس وشوهدت الاكياس النسجية في دماغ ٢ منها والحصول في النهاية على نسبة شفاء ٧٣٪ في هذه المجموعة من جراء استعمال الجرعة ٣٠٠ ملغم من المضاد المذكور. اتضح من هذه التجربة ان حجم الجرعة كان له تأثير كبير ليس في الحصول على نسبة شفاء عالية فقط بل في ارتفاع نسب البقاء الحي واطالة المعدل اليومي للحياة وهذا ما تاكد من النتائج المستحصلة من اعطاء ٣٠٠ ملغم/كغم/يوم

pharmokinetic للادوية قيد التجربة في علاج المرض في الانسان تبقى الحاجة إلى اجراء دراسات عن مستويات الدواء في المصول والانسجة وكذلك نظم العلاج والجرع القريبة إلى تلك التي من الممكن اجراءها على الانسان ولا يغيب عن الذهن محدودية النتائج الخارجة من النماذج الحيوانية على الوضع في الانسان.

الحيوانات المختبرية نظراً لسعة الاختلاف في الإصابة وخصائص البروتوكول العلاجي. وان واحداً من اهم خصائص هذه الدراسة هو طول فترة المراقبة التي اعقبت العلاج اذ شوهدت حالات الهالك التي حصلت خلال فترة المراقبة القياسية الممتدة لاربعة اسابيع واستمرار المراقبة لمدة ست اسابيع التي اعقبت الإصابة. وعلى اية حال لتثمين القوة الدوائية

الجدول (٦) تقييم تأثير المضاد الحيوي روكسيثرومايسين Roxithromycin على داء المقوسات الحاد المستحدث في الفئران لفترة اسبوعين من العلاج.

نهاية التجربة ٤٥ يوماً بعد الإصابة		(فترة العلاج + المراقبة)			الجرعة	المجموعة
التقييم الحيوي	الفئران الحية	٤٥ يوم	٤٥ يوم	٤٥ يوم	ملغم/كغم/يوم	العلاجية
% الشفاء	العدد	% البقاء	العدد	المعدل اليومي للحياة	عدد الفئران الهالكة/العدد الكلي	
٠	٠	٠	٠	٩,٨	١١/١١	الاولى
B٢٧	٣	٢٧	٣	٢٢	١١/٨	الثانية
A٧٣	٨	٩١	١٠	٤٤	١١/١	الثالثة

الحروف المختلفة عمودياً تعني وجود فروق معنوية بين المجاميع العلاجية عند مستوى احتمالية ٠,٠٥.

- McFadden DC, Camps M, and Boothroyd, C. Resistance as a tool in the study of old and new drug targets in *Toxoplasma*. Drug Resistance Updates, 2001; 4:79-84.
- Chamberland S, Kirst HA, and Current L. Comparative activity of macrolides against *Toxoplasma gondii* demonstrating utility of an *in vitro* microassay. Antimicrob Agent and Chemother. 1991, 32:903-909.
- Huskinson-Mark, J, Araujo EG and Remington JS. Evaluation of the effect of drugs on the cyst form of *Toxoplasma gondii*. J Infect Dis. 1991; 164:170-171.
- Derouin F, Piketty C, Chastang C, Chau F, Rouveix B and Pocidallo JJ. Anti-*Toxoplasma* effects of dapsone alone and combined with pyrimethamine. Antimicrob Agents & Chemother. 1991;35:252-255.
- Araujo, FG, Khan AA, Slifer TL, Bryskier A and Remington JS. The ketolide antibiotics HMR 3047 and HMR 3647 are active against *Toxoplasma gondii* *in vitro* and in murine models of infection. Antimicrob Agents & Chemother. 1997; 41:2137-2140.
- Theirmann E, APT W, Atias A, Lorca M and Oluin J A. Comparative study of some combined treatment regimens in acute toxoplasmosis in mice. Am. J Trop Med Hyg. 1978;27(4):747-750.
- Araujo FG, Shepard RM and Remington JS. *In vivo* activity of the macrolide antibiotics azithromycin, oxythromycin and spiramycin against *Toxoplasma gondii*. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 1991; 10:519-524.
- Wilson M and McAuley JB. *Toxoplasma*. 1999 p. 1374-1382. In P.R. Murry, E.J. Baron, M.A. Pfaller, F.C. Tenover, R.H. Yolken. (ed.) Manual of clinical microbiology. 7th ed., American Society for microbiology, Washington D.C.
- Stray PB. Treatment of toxoplasmosis in pregnant mother and newborn child. Scand. J Infect Dis., 1999;84:23-31.
- Cantin L and Chamberland S. *In vitro* evaluation of the activities of azithromycin alone and combined with pyrimethamine against *Toxoplasma gondii*. Antimicrob Agents Chemother. 1993; 37:1993-1996.
- Burza M (1993). Animal models. In the New Macrolides, (Neu, H.C., Young, L. and Zinner, S.H., eds). pp. 49-60, Matcel Dekker, New York.
- Durant J, Hazime F, Carles M, Pechera JC and Dellamonica P. Prevention of *Pneumocystis carinii* pneumonia and of cerebral

#### المصادر

- Bahar H, Karaman M, Kidar S, Yilmaz O, Celiloglu M, Mutul, D. The importance and validity of anti-*Toxoplasma gondii* IgG, IgM, IgA. Antibodies and IgG avidity Tests in the diagnosis of Toxoplasmosis infection during pregnancy. Turk Parazit Derg. 2005;29(2):76-79.
- Yazar S, Yaman O, and Salih I. Evaluation of the Results of IgG avidity Testinig of *Toxoplasma gondii* in Pregnant Women. Turk Parazit Derg. 2005;29(4):221-223.
- Kuk S, and Ozden M. A four Year investigation of seropositivity of *Toxoplasma gondii* in our Hospital. Turk Parazit Derg. 2007, 3(1).
- Tekay F. and Ozbek E. The seroprevalence of *Toxoplasma gondii* in Women from Sanhurfa, a Province with a High raw Meat ball Consumption. Turk Parazit Derg. 2007;3(3):176-170.
- Araujo FG, Slifer T, and Remington JS. Rifabutin is active in murine models of toxoplasmosis. Antimicrob Agents & Chemother. 1994, 38:570-575.
- Dumas JL, Chang R, Mermillod B, Pigué PF, Comte R and Pechere JC. Evaluation of the efficacy of prolonged administration of azithromycin in a murine model of chronic toxoplasmosis. J Antimicrob Chemother. 1994; 34:111-118.
- Romand S, Bryskier A, Moutot M and Derouin F. *In vitro* and *in vivo* activities of roxithromycin in combination with pyrimethamine or sulphadiazine against *Toxoplasma gondii*. J Antimicrob Chemother. 1995; 35:821-832.
- Change HR, Comte R, Pigué PF and Pechere JC. Activity of minocycline against *Toxoplasma gondii* infection in mice. J Antimicrob Chemother. 1991;27:639-645.
- Cheraldi A, Sarciron ME, and Peyron F. *Toxoplasma encephalitis*: influence of the vehicle on the efficacy of different doses of 2,3-dideoxyinosine in mice. Parasite. 2000; 7:39-42.
- Bruning JL and Kintz BL. Computational handbook of statistics. 2nd ed., Scott, Forsman and Company, Illinois, England, 1977, pp 308.
- Vukovic D, Djurkovic O and Kovacevic S. Effect of clindamycin in a model of acute murine toxoplasmosis. Clin Microbiol Infect. 1997; 3:89-94.
- Nichols BA, Chiappino ML, and Prevesio CE. Endocytosis at the micropore of *Toxoplasma gondii*. Parasitol. Res. 1994; 80:91-98.

المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد ٢٣، عدد إضافي ٢، ٢٠٠٩ (٣٦٠-٣٥١)  
وقائع المؤتمر العلمي الخامس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل

sulphamethoxzole *Pnemocystis carinii* and *Toxoplasma gondii* and infection in a rat model. J Antimicrob Chemother.1998; 41:Suppl. B, 57-62.

toxoplasmosis by roxythromycin in HIV-infected patients. Infection. 1995; 23, Suppl. 1, S33-38.  
25. Pascud MB, Chau F, Derouin F and Girard PM. Experimental evaluation of roxithromycin combined with dapsone or